

# 眉下切皮

## 什麼是「眉下切皮」？

眉下切皮是解決**眼皮鬆弛**、**眼皮腫厚**問題的一個手術。此手術適合有以下情況人士：


- 眼皮有鬆弛(多餘皮膚)
- 眼皮厚重, 看上去不精神
- 眼尾位置皮膚下垂
- 自己本身的雙眼皮幾乎被上眼皮覆蓋著, 變成「內雙」
- 當睜開眼睛時, 眼部化妝(眼線、眼影)都幾乎已看不見

## 手術特徵

1. **疤痕不明顯**  
傷口開在緊貼眉毛下方位置, 並不明顯。
2. **不腫**  
術後腫脹極輕微, 而且只維持2-3天。
3. **不易被人發現曾做手術**  
與雙眼皮手術不同, 提眉手術不會改變本身眼睛的形狀, 而是消除眼皮腫脹。適合追求自然變化的人。
4. **單眼皮人士也能進行**  
單眼皮人士亦能透過此手術解決眼皮厚重問題。由於並不是雙眼皮手術, 術後並不會變成雙眼皮。

## 做法

- 1) 決定切除的位置
- 2) 切除皮膚。如有需要, 會同時切除過多的眼窩脂肪及皮下脂肪(有收費)。
- 3) 縫合
- 4) 傷口緊貼眉毛, 並不明顯。術後1星期到診所拆線。



概要	
手術時間	約1小時
麻醉方法	局部麻醉 / 靜脈麻醉
拆線	6~7天後
眉毛化妝	拆線後的翌日
傷口泛紅	隨著時間淡化, 幾乎不能目測。 恢復期間以遮瑕膏或化妝掩飾會完全不被察覺。
腫脹	數天
注意	術後初期在閉眼時會出現眼睛不完全緊閉跡象, 此屬正常。約1星期左右慢慢恢復自然。
<b>抽煙者</b>	抽煙會阻礙血液循環, 導致傷口癒合不良及傷口受細菌感染。 <b>請手術前2週起至術後最少1個月進行禁煙。</b>

## 症例

## Sub Eyebrow Brephaloplasty





Before



After



before

immediately after





↑ 這是我  
早已做了此手術

**:: 預約或查詢 ::**

[francetoworkshop.com/yimei](http://francetoworkshop.com/yimei)